



**Requisitos de Inmunización de la escuela
(Edades y Grados de los Estudiantes Admitidos)**

EDAD/GRADO	Vacuna	Dosis	Comentarios
3 Y 4 años de edad (PK) solamente	HIB (Haemophilus Influenzae tipo B)	1 dosis	Debe haber recibido 1 dosis al o después de cumplir 15 meses de edad a menos que los estudiantes hayan recibido una serie de tres y un refuerzo. No puede ser dada después de los 5 años de edad.
	PCV13 (Vacuna Antineumocócica Conjugada)	1 dosis	Vacuna Antineumocócica Conjugada (PCV 13 reemplaza PCV7) Debe tener 1 dosis después de los 2 años de edad si no han tenido un historial de haber tenido 4 dosis. No se puede administrar después de los 5 años de edad.
3 y 4 años de edad en alto riesgo*	PPV23 (Vacuna Antineumocócica Polisacárida)	1 dosis	Vacuna Antineumocócica Polisacárida (PPV23) Niños con determinadas enfermedades crónicas o condiciones inmuno-supresoras requerirán también una dosis de PPV23 además de una dosis de PCV13, 2 meses después de la última dosis de PCV13.
3, 4, 5, años de edad (PK/K) solamente	Hepatitis A	2 dosis	Debe haber recibido 2 dosis en o después del 1 ^{er} cumpleaños. La primera dosis es seguida por una segunda dosis al menos 6 meses después.
PK – 12 ^o grado	IPV (Vacuna Antipoliomielítica Inactivada)	3-4 dosis	Ingresando a la escuela a la edad de 3 años: tercera dosis es requerida entre los 18 meses y los 3 años de edad. Deben recibir una 4 ^{ta} dosis tan pronto como sea posible después de cumplir 4 años. Ingresando a la escuela a la edad de 4 años: la última vacuna debe ser no antes de 4 días antes de cumplir los 4 años de edad. Todos los demás grados: necesitan 4 dosis, una dosis debe ser recibida en o después de los 4 años de edad. O, si la tercera dosis fue dada en o después de los 4 años de edad sólo se requieren 3 dosis. OPV (oral) o IPV (intravenosa) en cualquier combinación para las edades entre 4 y 6 años se considera una serie completa, independientemente de su edad en el momento de la 3 ^a dosis.
	MMR (Sarampión, Paperas y Rubéola)	2 dosis	K y 1^{er} grado: deben tener 2 dosis de la vacuna triple viral. La primera dosis de la vacuna triple viral deberá recibirse en o después del 1 ^{er} cumpleaños. Del 2 ^o al 12 ^o grado el requisito es 2 dosis de una vacuna que contenga el sarampión, y una dosis de vacuna contra la rubéola y las paperas.
	Varicela (Chicken Pox)	1-2 dosis	Debe recibir la primera dosis de varicela en o después del primer cumpleaños. Dos dosis son requeridas para K, 1^o, 7^o y el 8^o grado . Una dosis se requiere para todos los otros grados escolares. Para cualquier estudiante que recibe la primera dosis en o después de los 13 años de edad, son necesarias 2 dosis.
	Hepatitis B	3 dosis (5 mcg/0.5ml) 2 dosis (10 mcg/0.1ml)	Debe haber recibido una serie de 3 dosis. Para los estudiantes entre los 11 y 15 años de edad, 2 dosis cumplen con el requisito si se recibió la vacuna de adulto contra la Hepatitis B (Recombivax). La dosis y el tipo de vacuna deben estar documentados claramente. (Dos 10mcg/1.0ml Recombivax).
	DTaP (Difteria, Tétano y Tos ferina)	4 - 5 dosis	Ingresando a la escuela a la edad de 3 años: se requiere una cuarta dosis entre los 18 meses y los 3 años de edad. Deben recibir la 5 ^{ta} dosis tan pronto como sea posible después de cumplir los 4 años de edad. Todos los demás grados/edades: La quinta dosis debe ser no antes de los cuatro días de cumplir 4 años de edad. O, si la 4 ^{ta} dosis fue dada en o después de los 4 años de edad, sólo se requieren 4 dosis.
7-11 años de edad	Dt (Difteria, Tétano)	3 dosis	Si la DTP no se inició antes de los 7 años de edad, entonces se requieren 3 dosis.
7 ^o al 12 ^o grado.	Tdap (Tétanos, difteria y tos ferina acelular.)	1 dosis	Para el 7^o grado: 1 dosis de Tdap es requerida si han transcurrido por lo menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos-difteria. Para el 8^o al 12^o grado: 1 dosis de Tdap es requerida cuando han transcurrido 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos-difteria. Td es aceptable en lugar de Tdap si existe una contraindicación médica a la tos ferina.
7 ^o y 8 ^o grado.	MCV4 (Antimeningocócica Conjugada)	1 dosis	Requerida al ingresar al 7 ^o y al 8 ^o grado.
11 años de edad	HPV (Virus del Papiloma Humano)	3 dosis	Recomendada, no es requerida para niños y niñas.